



PERİODONTİTİSE BAĞLI PAPİL KAYBINDA ESTETİK VE FONKSİYONEL TEDAVİ VAKA RAPORU



Berfin CANPOLAT¹, Ceren PALALI¹, Merin Nur HACIOĞLU², Mustafa TUNALI¹

¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

GİRİŞ

Periodontitis, disbiyotik bakteri biyofilmleri ile ilişkili, diş destek dokularının ilerleyici yıkımı ile karakterize edilen kronik, multifaktöriyel bir enflamatuvar hastalıktır. Periodontitisin başlıca özellikleri arasında klinik ataşman kaybı ve alveoler kemik kaybı ile kendini gösteren periodontal doku desteğinin kaybı, periodontal cep oluşumu ve sondalamada kanama yer alır. Bununla birlikte özellikle ileri periodontitis vakalarında interproksimal kemik kaybına bağlı olarak papil kayıpları görülebilmektedir. Siyah üçgenlere neden olan bu kayıp, özellikle anterior bölgelerde estetik kaygılara neden olabilmektedir.

Bu vaka raporunda maksilla anterior bölgede bulunan papil kaybının tüberden alınan bağ doku ile tedavisi gösterilmiştir.



Resim 1 : Pre-operatif intraoral görüntü



Resim 2 : 3D ağız içi tarama görüntüsü

OLGU SUNUMU

45 yaşında kadın hasta maksiller anterior bölgesindeki papil kaybına bağlı siyah üçgen görüntüsünden kaynaklı estetik kaygı ile başvurmuştur. Klinik ve radyografik muayene sonucu 21 numaralı dişin distalinde 4 mm, 22 numaralı dişin mezyalinde 4 mm cep derinliği ve 3 mm dişeti çekilmesi saptanmıştır(Resim 1). Yapılan ağız içi taramada 4 mm interproksimal papil kaybı görülmüştür (Resim 2).

Faz I tedaviyi takiben ilgili bölgeye VISTA + bağ doku grefti(BDG) tekniği ile cerrahi müdahale yapılmıştır(Resim 3).



Resim 3 : Operasyon sonrası intraoral görüntü



Resim 4 : Post-operatif 15.gün intraoral görüntü



Resim 5 : Post-operatif 2.ay intraoral görüntü

SONUÇ

2 aylık takip sonucunda dişetinde kalınlaşma ve papil oluşumu görülmüştür. Ayrıca ilgili dişlerde 2 mm'ye varan klinik ataşman kazancı mevcuttur (Resim 4 ve Resim 5). Hastanın takibi devam etmektedir.

Tüberden elde edilen bağ doku greftlerinin hiperplastik büyüme eğilimi göstermesi , özellikle papil kaybı tedavilerinde oldukça elverişli olabilir.