



KOMBİNE ETİYOLOJİYE SAHİP DİŞ ETİ HİPERPLAZİSİ OLGUSUNDA FAZ1 TEDAVİ SONUÇLARI VAKA RAPORU



Eyşan ÇETİNKAYA , Mustafa TUNALI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ

Diş eti hiperplazisi, çeşitli etiyolojik faktörlere bağlı olarak gelişebilen, diş eti dokusunun anormal büyümesiyle karakterize bir durumdur. Bu olguda, hem ilaca bağlı hem de inflamatuvar faktörlerin bir arada rol oynadığı diş eti hiperplazisi gözlenmiştir. İlaç kullanımına bağlı hiperplazi, periodontal dokuların normal fizyolojik dengesi üzerinde doğrudan etkiler yaratırken, eşlik eden inflamasyon süreci bu etkileri daha da şiddetlendirmiştir. Tedavi yaklaşımında, faz 1 periodontal tedavi uygulanmış ve ilacın değiştirilmesi için ilgili uzmanlarla konsültasyon sağlanmıştır. Bu posterde, kombine etiyolojiye sahip diş eti hiperplazisi olgusunda gerçekleştirilen tedavi süreci ve elde edilen sonuçlar ele alınacaktır.



Resim 1 : faz 1 tedavi intraoral görünüm



Resim 2 : Pre-operatif radyograf

SONUÇ

Tedavi sonrası diş eti büyümesi ve spontan kanamada belirgin azalma gözlemlendi. Bu durum, faz 1 periodontal tedavi ve ilaç düzenlemesinin diş eti hiperplazisi yönetimindeki etkinliğini ortaya koymaktadır.



Resim 3: 5.ay intraoral görünüm

TARTIŞMA

Bu olgu, ilaç kullanımına bağlı diş eti hiperplazisinin inflamasyonla birleştiğinde periodontal sağlığı ciddi şekilde etkileyebileceğini göstermektedir. Tedavi sürecinde oral hijyen eğitimi ve motivasyonu, faz 1 periodontal tedavi ile birlikte önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, ilaç değişikliğinin etkisini değerlendirmek amacıyla faz 2 periodontal tedavi 6-12 ay ertelenmiş, böylece gereksiz cerrahi girişimlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.