

CERRAHİSİZ PERİODONTAL TEDAVİNİN KLİNİK YANSIMALARI: 2 OLGU SUNUMU

ŞEYMA NUR AKTÜRK¹, HATİCE YEMENOĞLU¹

1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

ULUSLARARASI 4.
DENTAL ORAL
ENFEKSİYONLAR ve 3.
AĞIZ MİKROBİYATASI
KONGRESİ

AMAÇ

Periodontal hastalık, plak biyofilmi tarafından başlatılan ve diş etinde enflamasyona, periodontal doku yıkımına ve alveolar kemik kaybına neden olan mikrobiyal, kronik, enflamatuvar bir durumdur.¹ Etken mikroorganizmalar olmakla birlikte hastalığın klinik boyutu ve şiddeti konağın bu mikroorganizmalara karşı verdiği yanıtla ilişkili olarak değişiklik gösterebilir. Cerrahisiz periodontal tedavi periodontitisin tedavisinde kullanılan en yaygın tedavi biçimidir. Bu olgu sunumunda, iki farklı vaka üzerinde cerrahisiz periodontal tedavinin etkilerini sunmayı amaçladık.

1.OLGU

19 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta diş etlerinde kızarıklık, kanama ve estetik şikayetlerle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede tüm dişlerinde sondalamada kanaması olan ancak patolojik bir cep bulunamayan hastaya şiddetli gingivitis teşhisi kondu (Resim 1). 15 gün içerisinde cerrahisiz periodontal tedavi tamamlandı, oral hijyen motivasyonu verildi, klorheksidin içerikli gargara 7 gün kullanılmak üzere reçete edildi ve hasta 6 hafta sonra kontrole çağrıldı. Kontrol seansında diş etleri sağlıklıydı. (Resim 2) Hasta 6 aylık rutin kontrollere çağrıldı.



Resim 1: İlk seans



Resim 2: 6 hafta sonra

2.OLGU

42 yaşında kadın hasta diş etlerinde spontan kanama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde hipertansiyon için Norvasc 10 mg kullandığı öğrenildi. (Resim 1,2) İlaça bağlı diş eti büyümesi olduğu düşünülerek ilk seans supragingival debridman yapıldı, oral hijyen motivasyonu verildi ve ardından ilacın değişmesi için dahiliye doktoruna konsülte edildi. Hastanın ilacı Diovan 80 mg ile değiştirildi. Bir ay içerisinde hastanın cerrahisiz periodontal tedavisi tamamlandı. (Resim 3) 6 hafta sonraki kontrolde patolojik cebi bulunmayan ve diş eti büyümesi ortadan kalkan hastaya cerrahi işlem planlanmadı ve hasta protetik tedavi için yönlendirildi. (Resim 4) Hasta 6 aylık rutin kontrollere çağrıldı.



Resim 1,2: İlk seans



Resim 3: Ara seans



Resim 4: 6 Hafta sonra

SONUÇ

Sunduğumuz her iki vaka da cerrahisiz periodontal tedavi ile yeterli iyileşmeyi gösterdi. Sonuç olarak periodontal hastalıkların tedavisinin temelini cerrahisiz periodontal tedavi oluşturmaktadır.