



ORAL LİKEN PLANUS: OLGU SUNUMU

¹Şeyda SAY, ¹Muhammet Can EREN, ¹Fahrettin KALABALIK, ¹Emre HAYLAZ, ¹İsmail GÜMÜŞSOY

¹Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Sakarya/Türkiye

4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar (DOINF4) ve 3. Ağız Mikrobiyotasi Kongresi
21-23 ŞUBAT 2025
SAKARYA, TÜRKİYE



AMAÇ

Oral liken planus, genellikle ağız içi mukozada görülen, kronik, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, bağışıklık sisteminin rol oynadığı, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Klinik olarak beyaz, ağrılı, retiküler lezyonlar veya erozyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu sunumda klinik bulgularını ve tanı kriterlerini inceleyeceğiz.



Resim 1: Sağ yanak mukozasındaki lezyonun intraoral görüntüsü.



Resim 2: Sol yanak mukozasındaki lezyonun intraoral görüntüsü.

OLGU SUNUMU

60 yaşında kadın hasta kliniğimize sol yanak mukozasındaki iyileşmeyen lezyon için başvurdu. Almış olduğumuz anamnezde hastanın medikal hikayesinde herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı ve lezyonun asemptomatik olduğu öğrenildi. Yapılan ağız içi muayenede lezyonun çift taraflı yanak mukozasıyla sınırlı olduğu, ilgili bölgelerde herhangi bir iritasyon etkeni (yanak ısırma, keskin dolgu kenarı, amalgam restorasyon, sigara gibi) olmadığı saptandı. Hasta biyopsi için dermatolojiye yönlendirildi. Yapılan histopatolojik değerlendirmede lezyon Liken Planus ile uyumlu bulundu. Klinik değerlendirme ve biyopsi sonucunda olguya liken planus tanısı konuldu.



Resim 3: Sol yanak mukozasından alınan intraoral görüntü.



Resim 4: Sol yanak mukozasından alınan intraoral görüntü.

SONUÇ

Bu olguda, oral mukozadaki beyaz lezyonlar ve erozyonlar ile hastalık tanısı konmuş, klinik bulgular ve histopatolojik incelemelerle kesin tanıya ulaşılmıştır. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın ilerlemesini engelleyebilir ve semptomları kontrol altına alabilir, böylece hastanın yaşam kalitesi artırılabilir.