



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji

**KERATİNİZE DİŞ ETİ EKSİKLİĞİNİN SERBEST DİŞ ETİ GREFTİYLE TEDAVİSİ:
2 YIL TAKİPLİ OLGU SUNUMU**

Berna Çelik Kahraman¹, Ayşenur Şahin¹, Ömer Alperen Kırmızıgül¹
¹Inönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Malatya, Türkiye
berna.celik@inonu.edu.tr


Amaç: Serbest dişeti grefti, açıkta kalan kök yüzeyini örtmek, vestibül derinliğini arttırmak ve keratinize dişetini genişliğini arttırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Keratinize dişetinin varlığı, ağız hijyeninin gelişmesine olanak tanıyarak plak kontrolünü sağlamaktadır. Bu olgu sunumunda, alt çene ön bölgedeki yetersiz keratinize dişetinin serbest diş eti grefti ile rehabilitasyonu ve vakanın 2 yıllık takibi rapor edilmektedir.

PRE-OP



Olgu Sunumu: Sistemik olarak sağlıklı, 28 yaşında kadın hasta dişetlerinde hassasiyet şikayetiyle periodontoloji kliniğine başvurdu. Klinik muayene sonucunda ilgili bölgede keratinize diş eti yetersizliği tespit edildi. Faz I tedavi tamamlandıktan sonra ilgili bölgeye serbest diş eti grefti operasyonu planlandı. Lokal anestezi uygulamasının ardından 15c bistüri kullanılarak alıcı bölge hazırlandı. Greftin konumlandırılması planlanan bölge deepitelize edildi. Palatinal bölgeden 15x5x1 mm boyutlarında greft elde edildi. Verici bölgeye fibrin sünger uygulaması yapılarak 5-0 rezorbe olabilen sütur ile askı sütur atıldı. Alıcı bölgede greft 6-0 rezorbe olabilen basit süturlar ile stabilize edildi. Ameliyat sonrası iyileşme sorunsuz gerçekleşti. Vakanın 1,3,6.ay ve 2 yıl sonrası takibi yapıldı.

İNTRA-OP



POST-OP 2.YIL



Sonuç: Serbest dişeti grefti operasyonu yapışık dişeti miktarını arttırmada yüksek başarı oranına sahiptir. Literatürde bu yöntemin dokuların stabilitesini uzun vadede koruduğu gösterilmiştir.