

FİKSASYON VİDASI DESTEĞİ İLE İMLANT ÇEVRESİNDE KERATİNİZE DOKU OLUŞTURULMASI: VAKA SUNUMU

DERYA AÇIKGÖZ CANDEMİR¹, OĞUZ KÖSE¹

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı , Rize

AMAÇ:

Sağlıklı ve uzun ömürlü implantlar yerleştirebilmek için periimplanter dokuların durumu büyük önem arz etmektedir. Yeterli keratinize diş eti genişliği bulunmayan bölgelerde keratinize doku oluşturulması implantın sağ kalım süresini uzatmakta ve hastanın plak kontrolü sağlamasına yardımcı olmaktadır .

VAKA SUNUMU:

Periodontoloji kliniğimize 65 yaşında erkek hasta ağızdaki dişsiz bölgelerine implant yaptırmak için başvurdu. Gerekli intraoral ve tomografik incelemeler sonrasında implant tedavisi için uygun olan hastanın mandibular sol posterior bölgesine 2 adet implant yerleştirilmesine karar verildi (1). İmplant ameliyatı esnasında vestibül sulcusun sığ olduğu ve implantların etrafında yeterli keratinize doku genişliği bulunamayacağı tespit edildi. Bu bölgede yeterli diş fırçalama yapamayacağı dolayısıyla ileride implantın kaybına kadar giden durumların ortaya çıkacağı bilindiğinden operasyon esnasında yumuşak dokuda düzenleme yapıldı. Bukkal bölgede doku arttırımı için kret tepesinin 2-3 mm kadar lingualinden insizyon yapıldı. Bukkal flep fiksasyon vidaları yardımıyla apikale pozisyone flep haline getirilerek yeni konumuna adapte edildi.(2) 10.Gününde süturlar alındı.(3) Fiksasyon vidaları çıkartıldı. Bölgede istenilen keratinize doku genişliği oluşturulduğu görüldü.(4)

SONUÇ :


Operasyon sonucunda , fiksasyon vidalarından alınan desteğin ameliyat öncesi hedeflenen keratinize doku arttırımına katkı sağladığı görülmektedir. Yumuşak doku augmentasyonu İmplant tedavisinin geç dönem komplikasyonlarını azaltıp periimplanter sağlık konusunda istenilen başarıya büyük katkı sağlamaktadır.

REFERANSLAR


- 1.YENİYOL S., Qamheya A., ARISAN V., KARABUDA Z. C. , "Apikale kaydırılan flep tekniği ile implant çevresi keratinize dokunun apiko-koronal miktarının artırılması: Vaka serisi", Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.14, ss.16-19, 2013
2. Referans2. Jepsen S, Caton JG, Albandar JM, Bissada NF, Bouchard P, Cortellini P, et al. Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions: Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45:219-29.



1-OPERASYON ÖNCESİ



2-OPERASYON SONRASI FİKSASYON VİDALARI İLE KERATİNİZE DOKUNUN APİKALE SABİTLENMESİ



3-10. GÜNDE FİKSASYON VİDALARI ALINDIĞINDA



4- OPERASYONUN 1. YIL GÖRÜNTÜSÜ