

DERYA AÇIKGÖZ CANDEMİR¹, BETÜL DİRİLMİŞ¹, MELTEM ZİHNİ KORKMAZ¹
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı , Rize

AMAÇ:

Dişeti çekilmeleri hastalarda hassasiyet şikayetlerinin yanında estetik problemlere de sebep olmaktadır. Bu vaka da açığa çıkmış kök yüzeylerinin subepiteyal bağ doku grefti ve tünel tekniği kullanılarak kapatılması amaçlanmaktadır.



VAKA SUNUMU:

Kliniğimize diş eti çekilmesi ve hassasiyet şikayeti ile başvuran 42 yaşındaki kadın hasta detaylı şekilde muayene edildi ve periodontal kayıtları alındı. Sigara kullanmayan ve sistemik herhangi bir hastalığı bulunmayan hastanın sağ üst çene 14-15-16 numaralı dişler bölgesinde diş eti çekilmesi olduğu görüldü. Cerrahisiz periodontal tedavi olarak supragingival ve subgingival debridmanı yapıldı ve sıkı ağız hijyeni talimatlarını içeren bir ameliyat öncesi bakımı verildi. Minimal invaziv olması ve papiller bölgesini koruması sebebiyle tercih edildi. İlgili dişler bölgesindeki flep dikkatlice kaldırıldı ve hastanın sol üst palatinal bölgesinden alınan bir bağ dokusu grefti, 14-15-16 numaralı dişler etrafında dikkatlice oluşturulan tünel aracılığıyla yerleştirildi. Askı sütür tekniği uygulanarak flep dişlerin bukkaline kompozit ile asıldı. Periodontal pat uygulandı. Hastaya ağrı kesici ve antimikrobiyal gargara reçete edildi. 10 gün sonra periodontal pat alındı. Bölgede iyileşme belirtileri olarak keratinizasyon artışı görüldü. Hastamızın 1. ay kontrolünde çekilme bölgesindeki diş etinin mine - sement sınırın yaklaştığı ve hastanın hassasiyet şikayetlerinin geçtiği öğrenildi.



SONUÇ:

Diş eti çekilmelerinde bağ doku greftinin tünel tekniği ile birlikte uygulanması intraoperatif zor bir işlem olsa da , minimal invaziv yaklaşımlı bir teknik olması sebebiyle hasta açısından daha konforlu bulunmaktadır. Papiller bölgesinde hassas çalışma gerektiren bu teknik periodontal iyileşme açısında istenilen sonuçları vermektedir.



Referanslar :

- 1.Zucchelli G, Mounssif I: Periodontal plastic surgery. Periodontol 2000. 2015, 68:333-68.
2. Zuhr O, Fickl S, Wachtel H, Bolz W,Hürzeler MB. Covering of gingival recession with a modified microsurgical tunnel technique: A case report. Int J Periodontics Restorative Dent. 2007;27(5):457-463.
- 3.Cairo F, Nieri M, Pagliaro U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures in the treatment of localized facial gingival recessions. A systematic review. J Clin Periodontol. 2014;41(15):44-62.