

Mandibular Anterior Bölgedeki Yapışık Dişeti Yetersizliğinin Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Ayşenur ŞAHİN¹, Berna ÇELİK KAHRAMAN¹, Ömer Alperen KIRMIZIGÜL¹

¹Inönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

ayse_02@windowslive.com

Amaç

Yapışık diş eti genişliği ile diş çevresindeki plak akümülayonu arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Yapışık dişeti genişliğini arttırmak için çeşitli periodontal plastik cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Bu kapsamda; saplı yumuşak doku greftleri (laterale pozisyone flep, çift papilla flebi, koronale pozisyone flep, semilunar flep), serbest yumuşak doku greftleri (serbest dişeti grefti, subepitelyal bağ dokusu grefti) veya rejeneratif teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı serbest dişeti grefti ile yapışık diş eti genişliğini arttırmaktır.


Olgu Sunumu

Sistemik olarak sağlıklı 40 yaşındaki kadın hasta kliniğimize mandibular anterior dişlerinde dişeti çekilmesi ve hassasiyet şikayetiyle başvurdu. Yapılan klinik ve radyografik muayeneler sonucunda mandibular santral kesici dişlerinde keratinize dişeti yetersizliği gözlemlendi. Hastaya Faz-1 periodontal tedavi sonrası serbest dişeti grefti tedavisi planlandı. Alıcı bölge uygun genişlik ve yükseklikte hazırlandı. Serbest dişeti grefti sağ palatal bölgeden alındı. Greft alıcı bölgeye adapte edildi ve 6.0 rezorbe olan sütür materyali ile sütüre edildi. Kanama kontrolü için damak bölgesine kollajen sünger yerleştirildi ve sütüre edildi. Cerrahi işlemler sırasında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Post-op 1. haftada damaktaki süturlar, post-op 2. haftada alıcı bölgedeki süturlar alındı. Klinik parametreler ve ağız içi fotoğraflar başlangıç, 2. hafta, 6. ay ve 18. ayda kaydedildi. Yapılan tedavi sonucunda keratinize dişetinin arttığı görüldü.

Pre-op



İntra-op



Post-op 2. Hafta



Post-op 6. ay



Post-op 18. ay



Sonuç

Bu olgu ve güncel literatüre dayanarak serbest diş eti greftinin keratinize diş eti miktarını arttırmak ve diş çevresi plak akümülayonunu azaltmak için etkili bir yol olduğu söylenebilir.

Referanslar

Bouchard P, Malet J, Borghetti A, 2001. Decisionmaking in aesthetics: root coverage revisited. Periodontol 2000; 27: 97- 20.

Tavelli L, Barootchi S, Avila-Ortiz G, Urban IA, Giannobile WV, Wang HL. Peri-implant soft tissue phenotype modification and its impact on peri-implant health: A systematic review and network meta-analysis. J Periodontol. 2021 Jan;92(1):21-44. doi: 10.1002/JPER.19-0716. Epub 2020 Aug 9. PMID: 32710810.